

Uitleg: AMTS ¹

1 Doel

Screening naar stoornissen in oriëntatie, tijd, ruimte, personen, kort geheugen en aandacht.

2 Reden

Heel wat patiënten vertonen problemen met oriëntatie i.k.v. dementie of delier. Geheugenstoornissen kunnen een teken zijn van dementie of depressie. Aandachtstoornissen zijn afwijkend bij depressie en delier.

3 Instructies

Na de klokttest vraagt u om te antwoorden op 10 vragen. Vertel erbij dat sommige vragen heel simpel zijn, andere moeilijk. Bovendien is het soms goed om te zeggen dat deze test bij iedereen op de dienst gebeurt en niet speciaal voor deze patiënt. Op die manier krijg je soms ook achterdochtige patiënten tot een goede medewerking. Ga recht tegenover de patiënt zitten zodat hij/ zij u kan horen en zien spreken. Roep niet maar articuleer vooral goed. Reduceer achtergrondlawaai. Doe de radio of TV uit en doe de deur dicht.

4 Interpretatie

Score: 10/10 = een perfecte test

Patiënten met gevorderde dementie behalen meestal minder dan 4/10.

Patiënten met licht geheugen en/of aandachtstoornissen halen 7 tot 9/10.

De aandacht is gestoord als de patiënt niet achteruit kan tellen. Het korte geheugen is gestoord als de patiënt de straatnaam is vergeten.

¹ AMTS: Abbreviated Mental Test Score

Test van geheugen en oriëntatie (volgens Denham-Jeffreys)