

Cornell scale ¹

1 Instructies

A= niet te beoordelen

0 = afwezig

1 = licht of wisselend afwezig

2 = ernstig

De beoordelingen zijn gebaseerd op symptomen en kenmerken zoals waargenomen in de week voorafgaande aan het interview. Er dient geen score te worden gegeven wanneer symptomen het resultaat zijn van lichamelijke beperkingen of ziekte.

A. Stemminggerelateerde kenmerken				
1. Angst angstige gezichtsuitdrukking, peinzend, zorgelijk	A	0	1	2
2. Verdrietig verdrietige gezichtsuitdrukking, verdrietige stem, huilerig	A	0	1	2
3. Reageert niet op plezierige gebeurtenissen	A	0	1	2
4. Prikkelbaarheid gauw kwaad, slecht gehumeurd	A	0	1	2
B. Gedragsstoornissen				
5. Agitatie rusteloosheid, handenwringen, haarplukken	A	0	1	2
6. Vertraging trage bewegingen, langzame spraak, trage reacties	A	0	1	2
7. Meervoudige lichamelijke klachten (scoor 0 indien GI symptomen)	A	0	1	2
8. Interesseverlies tav gebruikelijke activiteiten (scoor alleen indien er een plotselinge verandering is opgetreden, dwz binnen en periode van 1 maand)	A	0	1	2

¹ Cornell scale for depression in dementia (CSDD): die is een beoordelingsschaal voor depressie bij een matige tot ernstige dementie. De schalen worden gescoord door een hulpverlener met informatie die verkregen is door een interview met de patiënt en een observant (verpleegkundige/ partner of familielid). Een cut-off waarde van >8 duidt op lichte depressiviteit en >12 op matige/ ernstige depressiviteit.

C. Lichamelijke kenmerken				
9. Vermindering van eetlust eet minder dan gewoonlijk	A	0	1	2
10. Gewichtsverlies (scoor 2 indien meer dan 2 kilo in 1 maand)	A	0	1	2
11. Gebrek aan energie gauw moe, niet in staat activiteiten vol te houden (scoor alleen indien er een plotselinge verandering is opgetreden, dwz binnen een periode van 1 maand)	A	0	1	2
D. Cyclische functies				
12. Dagelijkse stemmingsschommelingen 's morgens meer symptomen	A	0	1	2
13. Moeite met inslapen later dan gewoonlijk voor deze persoon	A	0	1	2
14. Wordt 's morgens meerdere malen wakker	A	0	1	2
15. Wordt 's morgens vroeg wakker vroeger dan gewoonlijk voor deze persoon	A	0	1	2
E. Stoornissen in de gedachteninhoud				
16. Suicide gedachten vindt het leven niet de moeite waard, heeft doodswensen of doet een poging tot zelfmoord	A	0	1	2
17. Lage zelfwaardering zelfverwijten, minacht zichzelf, gevoel te falen	A	0	1	2
18. Pessimisme verwacht het ergste	A	0	1	2
19. Wanen die overeenstemmen met de stemming wanen m.b.t. armoede, ziekte, verlies	A	0	1	2

Afgenomen door:		Score:/38
Afgenomen op:/...../.....		