

**Bronchoscopie**  
**Informatiebrochure**





# Inhoudstafel

<b>INHOUDSTAFEL .....</b>	<b>3</b>
<b>1 WAARVOOR WORDT BRONCHOSCOPIE GEBRUIKT? .....</b>	<b>4</b>
<b>2 VOORBEREIDING.....</b>	<b>9</b>
<b>3 VERLOOP .....</b>	<b>9</b>
<b>4 NAZORG.....</b>	<b>9</b>
<b>5 COMPLICATIES.....</b>	<b>10</b>
<b>6 CONTACTGEGEVENS .....</b>	<b>10</b>


In het midden van deze brochure:

## **TOESTEMMINGSFORMULIER BRONCHOSCOPIE**

(uitneembaar: meebrengen op de dag van het onderzoek)

# 1 Waardoor wordt bronchoscopie gebruikt?

- » Diagnose van longtumor, longinfectie, onverklaarde hoest, ophoesten van bloed...
- » Nemen van weefselstaal van luchtweg of long.
- » Opsporen en verwijderen van vreemd voorwerp.
- » Lokaliseren en/of stoppen van longbloeding.





# Toestemmingsformulier bronchoscopie

Datum en uur van het onderzoek:

.....

Ik, ondergetekende:

(naam): .....

(adres): .....

.....

verklaar hierbij dat ik deze informatiebrochure **bronchoscopie** heb gelezen en geef hierbij toestemming tot het uitvoeren van dit onderzoek.

Datum: .....

Handtekening:

***Gelieve dit toestemmingsformulier terug mee te brengen  
naar het ziekenhuis voor uw dossier.***





## 2 Voorbereiding

- » U dient nuchter te zijn voor een bronchoscopie: 4 uur voor het onderzoek mag u niet eten, drinken of roken.
- » Voorzie vervoer naar huis: na het onderzoek mag u diezelfde dag zelf geen voertuig besturen indien een rustgevend medicijn werd toegediend.
- » Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte over:
  - bloedingsproblemen;
  - hartafwijkingen of kunstklep;
  - medicatie die u inneemt of tot voor kort inname;
  - diabetes;
  - (vermoeden van) zwangerschap.
- » Breng steeds recente beeldvorming (RX, CT) mee als deze niet in AZ Alma werd verricht.

## 3 Verloop

Duur: gemiddeld 15 à 30 minuten.

- » U neemt plaats in een aangepaste stoel met uw hoofd in een kussen.
- » Uw keel of neus wordt plaatselijk verdoofd.
- » Daarna plaatst de arts een bijtring tussen uw tanden.
- » De flexibele bronchoscoop wordt via de mond of neus ingebracht en langzaam naar de luchtpijp (trachea) en de diverse luchtpijptakken (bronchi) doorgeschoven.

U kan tijdens het onderzoek niet spreken, maar wel normaal ademen.

## 4 Nazorg

Besprek steeds met uw arts wanneer u uw bloedverdunner mag herstarten als u deze neemt.

Na het onderzoek blijft u nog 1 tot 2 uur in het ziekenhuis ter observatie.

U mag vanaf 2 uur na het onderzoek terug eten en drinken.

Na het onderzoek kan u last hebben van:

- » licht pijnlijke of droge keel;
- » hoesten door lokale prikkeling van luchtwegen.

## 5 Complicaties

Een bronchoscopie is een veilig onderzoek.

Zeer zeldzame verwikkelingen van bronchoscopie zijn:

- » allergische reactie op verdovingsmiddel;
- » schade aan stembanden;
- » longbloeding;
- » klaplong;
- » hartritmestoornissen;
- » laag zuurstofgehalte.

## 6 Contactgegevens

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kan u steeds terecht op de polikliniek Pneumologie tussen 8 en 17 uur.

### **Pneumologie**

Dr. Hannelore Goeminne

Dr. Hans Jonnaert

Dr. Katrijn Van Assche

Tel. secretariaat 09 310 13 77