

Clostridium difficile

Clostridium difficile is een bacterie die kan voorkomen in de darm, ook zonder dat u er klachten door heeft. Bij verzwakte natuurlijke weerstand van de darm, vaak door innemen van antibiotica, zal de bacterie snel uitbreiden en gifstoffen aanmaken die de darmwand aantasten.

Symptomen

Een darmontsteking door Clostridium difficile geeft buikkrampen, koorts en een waterige, onfris ruikende diarree. Soms kan er ook bloed en slijmen in de stoelgang aanwezig zijn.

Een laboratoriumtest zal de aanwezigheid van Clostridium difficile bevestigen.




Hoe wordt het overgedragen?











Vanaf het begin van de diarree tot het einde ervan kan de bacterie zeer gemakkelijk overgedragen worden. Dit gebeurt door eenvoudige menselijke contacten, maar ook door het gemeenschappelijke gebruik van ruimten en materialen. Om het verspreiden van de kiem te vermijden, zijn een aantal voorzorgsmaatregelen nodig.

Welke maatregelen worden er genomen

U wordt verzorgd op een **éénpersoonskamer**.

In uw kamer wordt informatie opgehangen over de te nemen maatregelen door middel van een **isolatiekaart "CONTACT"**:

Standaardvoorzorgen infectiepreventie				Bij elk zorgcontact	
Basiseisen handhygiëne	Handhygiëne: de 5 momenten	PBM's bij risico op spatten met lichaamsvochten	Reinigen & ontsmetten omgeving		
	<ul style="list-style-type: none">Vóór contact met patiëntVóór een zuivere / invasieve handelingNa contact met de patiëntNa contact met lichaamsvochten / slijmvliesNa contact met de directe omgeving			Oppervlakte-desinfectie (Spray)	

Contact					Steeds in combinatie met standaardvoorzorgen	
Bronisotatie	Bezoeker	Personeel ZONDER direct patiëntcontact	Personeel MET direct patiëntcontact	Patiënt verlaat de kamer		
Voor en na bezoek handen ontsmetten (2)						
Handschoenen						
Isolatieschort						
Deur bij voorkeur sluiten						
Schoonmaak	<ul style="list-style-type: none">Zie procedures Zeyja / Vernevelen bij (3)Altijd beschermerschort bij patiënt besmet met micro-organisme vermeld in (3)					

(1) Bij MRSA, VRE, CPE, CDIF, NORO, MDRO
(2) Bij Clostridium meer handen wassen
(3) Vernevelen: MRSA, VRE, CPE, CDIF, NORO, MDRO of op vraag van Team Ziekenhuishygiëne

© Team ziekenhuishygiëne Versie: 2018/2024 afbak-patijnt-1st 25/01/2020

Wat kan u doen als patiënt?

U blijft op uw kamer met **gesloten deur**.

U draagt bij voorkeur kledij die kan gewassen worden aan 60°C of hoger.

U **ververst de kledij bij voorkeur dagelijks** en steeds wanneer deze bevuild is met stoelgang.

Gedragen kledij bewaart u in een gesloten plastic zak onderin uw kleerkast. Het kan zo meegenomen worden naar huis om, liefst apart, **zo warm mogelijk te wassen (minimum 60°C)**.

U past goede handhygiëne toe. Dat wil zeggen dat u de handen grondig wast en droogt:

- zeker als de handen zichtbaar vuil zijn;
- voor de maaltijd;
- na toiletgebruik;
- als u toch uw kamer moet verlaten voor onderzoek of behandeling.

U laat persoonlijke zaken zoals handdoek, kam, scheergerief, drinkglas... niet gebruiken door anderen.

Wat moet u doen als bezoeker?

- Meld u bij uw eerste bezoek aan bij de verpleging.
- Ontsmet de handen bij aankomst in het ziekenhuis.
- **Was en ontsmet de handen bij het verlaten van de kamer.**
- Nuttig geen voedsel tijdens het bezoek.
- Gebruik geen het toilet van de patiënt.

Kledij van de familie in plasticzak meenemen en thuis apart wassen op minimum 60°C

Opheffen isolatiemaatregelen

Wanneer u 2 volle dagen (48 uren) geen diarree heeft gehad, zijn er geen bijkomende maatregelen meer nodig. Uw kamer wordt grondig gereinigd en ontsmet. Een goede handhygiëne blijft steeds belangrijk.

Verwittig tijdig uw arts of verpleegkundige bij opnieuw optreden van diarree. In dat geval zal men de maatregelen opnieuw instellen.

Contactgegevens

Team Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie

E-mail: ziekenhuishygiene@azalma.be

Darmontsteking Clostridium Difficile

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be

