

## Inleiding

Met deze folder willen we u informatie geven over het **voorkomen en herkennen van extravasatie tijdens de toediening van cytostatica = chemotherapie**.

Om deze complicatie zo veel mogelijk te voorkomen, is uw bijdrage van groot belang om uw behandeling in maximale veiligheid te laten verlopen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan zeker niet deze te stellen. De artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners geven u graag meer uitleg.

## Wat is extravasatie?

Wanneer medicatie in de vorm van vloeistof (zoals chemotherapie, immunotherapie) via een bloedvat moet worden toegediend, maar buiten het bloedvat **in de huid terecht komt**, heet dat extravasatie.

## Achtergrond

Intraveneuze producten, dit zijn producten die via een bloedvat worden toegediend, kunnen blaartrekkend, irriterend en niet-blaartrekkend of neutraal zijn.

Onder de cytostatica zijn er heel wat geneesmiddelen met een **blaartrekkend effect** (= geven blaarvorming).

## Mogelijke symptomen

De belangrijkste symptomen die u kan gewaarworden rond de injectieplaats of in de omringende zone:

- pijn
- zwelling
- roodheid
- ongemak langsheen bovenarm, borststreek of hals
- branderig gevoel
- stekend gevoel
- andere veranderingen op de plaats van de extravasatie

Geen van deze klachten vormt op zich een bewijs van extravasatie, maar ze moeten met de nodige aandacht worden behandeld. De klachten kunnen aanleiding geven tot verder onderzoek van de plaats van uw infuus bv. controle van de doorgankelijkheid.

Mochten bij de start of tijdens de toediening van chemotherapie één of meer symptomen optreden, dan dient u onmiddellijk de verpleegkundige te verwittigen.

## Voorzorgsmaatregelen

Probeer de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, op die manier worden eventuele complicaties zoveel mogelijk te vermeden.

- Draag bij elke toediening losse kledij die geen hinder kan geven voor het plaatsen van een katheter of het aanprikken van de poortkatheter. Bij voorkeur geen getailleerde blouse of opgerolde mouwen.
- Beperkt tijdens de toediening zoveel mogelijk (bruuske) bewegingen aan de zijde waar de katheter zit.
- Voorkom zoveel mogelijk dat de leiding van het infuus teveel naast het bed of de zetel hangt.
- Vermijd trekkracht op de leiding van het infuus.



## Contactgegevens

### **Dag 11** Dagziekenhuis onco en interne

Tel. 09 310 18 09

### **ZE 23** Ademhaling en oncologie

Tel. 09 310 18 23

## Extravasatie door cytostatica Preventie

### Contactinfo

#### **vzw AZ Alma**

(Maatschappelijke Zetel)  
Ringlaan 15  
B-9900 Eeklo  
tel. 09 310 00 00

#### **Polikliniek AZ Alma Sijsele**

Gentse Steenweg 132  
B-8340 Sijsele-Damme  
tel. 09 310 00 00

[www.azalma.be](http://www.azalma.be)

