

Wat is een EBUS?

Een EBUS wordt ook **endobronchiale echografie** genoemd en is een onderzoek van de lymfeklieren gelegen tussen de luchtpijp en de longen.

De arts gebruikt bij dit onderzoek een speciale bronchoscoop (flexibele buis) die vooraan een kleine echografietip heeft. Hiermee kan de arts doorheen de wand van de luchtpijp kijken en klieren in de directe omgeving opsporen. Met een fijne naald kan de arts vervolgens deze klieren ook aanprikken voor verder onderzoek (punctie).

Voorbereiding

Voor dit onderzoek dient u **nuchter** te zijn. Dit wil zeggen dat u niet meer mag eten of drinken vanaf middernacht.

Eventuele medicatie mag u innemen met een klein beetje water. Bespreek echter eerst met uw behandelende arts welke medicatie u mag innemen. Bepaalde **bloedverdunding** dient gestopt te worden (Marevan®, Marcoumar®, Plavix®, Xarelto®, Pradaxa®, Sintrom®), bespreek ook dit met uw arts.

Het onderzoek wordt ambulante uitgevoerd, u hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten. Indien u een gebitsprothese of bril draagt, graag verwijderen voor het onderzoek.

Verloop van het onderzoek

Dit onderzoek is niet pijnlijk. Het is echter wel onaangenaam en duurt **ongeveer 60 minuten**.

Een EBUS gebeurt **onder algemene verdoving**. Dit betekent dat u slaapt gedurende het onderzoek. Uw hartritme, zuurstofgehalte in het bloed en bloeddruk worden nauwgezet opgevolgd.

De arts brengt de bronchoscoop tot in uw luchtpijp en kan zo door de luchtpijp kijken en klieren opsporen. Ook kan, indien nodig, via deze weg een punctie worden uitgevoerd.

Nadien blijft u nog even op de ontwaakzaal ter observatie, aangezien u verdovende medicatie heeft gekregen. Wanneer u goed wakker bent, wordt u terug naar de kamer gebracht.

Na het onderzoek

Pas 2 uren na het onderzoek mag u opnieuw beginnen drinken of eten.

De arts komt langs op de kamer en wanneer u zich goed voelt, mag u het ziekenhuis verlaten onder begeleiding. Neem voldoende rust.

Omwille van de verdovende medicatie die u kreeg, mag u 24 uur lang **NIET zelf met de auto rijden**.

U krijgt een vervolgspraak mee voor bespreking van de resultaten bij uw behandelende arts.

Mogelijke bijwerkingen

Een EBUS geeft enkele ongemakken, maar dit hoeft geen reden tot ongerustheid te geven.

U kan last hebben van volgende bijwerkingen:

- **Temperatuursverhoging of koorts.**
Neem hiervoor een koortswerend middel in zoals paracetamol (Dafalgan®, Perdolan®).
Neem geen aspirine, deze zijn bloedverdundend.
- Lichte of pijnlijke **irritatie in de keel**.
- Ophoesten van enkele **bloedfluisen**.
Dit verdwijnt in de loop van de dag.
- **Kortademigheid en hoestklachten**.
Deze verdwijnen wanneer de verdoving volledig is uitgewerkt.

Zeer zeldzame complicaties zijn: hevige pijn, schade aan de stembanden, longbloeding, perforatie.

Neem contact op met uw arts wanneer u: plots ademhalingsproblemen krijgt, bij pijn op de borst, wanneer u veel bloed begint op te hoesten of wanneer u hoge koorts heeft die niet overgaat na het innemen van een koortswerend middel.



Contactgegevens

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kan u steeds terecht bij:

polikliniek Pneumologie tel. 09 310 13 77

Gelieve deze flyer terug mee te brengen naar het ziekenhuis voor uw dossier.

Datum EBUS: _____
Uur opname: _____
Arts: _____
Medicatie: _____
Bloedverdunding gestopt op: _____
Handtekening van de patiënt:

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be

Endobronchiale echografie (EBUS)

