

## Wat is contrastextravasatie?

U heeft zojuist een onderzoek ondergaan waarvoor toediening van contrastvloeistof nodig was. U kreeg hiervoor een infuus in een bloedvat van uw arm. Via het infuus werd de contrastvloeistof in uw bloedvat ingespoten.

Helaas kan tijdens het injecteren een deel contraststof buiten het bloedvat en onder de huid terechtkomen. Dit kan voorkomen als er naast het bloedvat geprikt wordt of als er lekkage optreedt.

## Symptomen

Door deze onderhuidse ophoping van contrastvloeistof kunt u vrijwel onmiddellijk een branderig gevoel en een harde, pijnlijke zwelling op de insteekplaats krijgen. Uw lichaam zal normaal deze onderhuidse contrastophoping zelf draineren waardoor de zwelling zal verdwijnen. Dit kan een paar dagen duren.

## Behandeling

### Bij geringe contrastextravasatie

De verpleegkundige brengt op Medische beeldvorming een geschikte zalf aan op de plaats van extravasatie en dekt deze af met een verband.

U krijgt de zalf mee naar huis. Het is aangewezen deze zalf 's avonds nogmaals dik aan te brengen (niet volledig inmasseren). U mag dit tot 2x per dag herhalen tot de zwelling is verdwenen.

### Bij uitgebreide contrastextravasatie

De extravasatieplaats zal op Medische beeldvorming onmiddellijk afgekoeld worden met een koud (niet vochtig) compres of coldpack gedurende een 15-tal minuten. U herhaalt deze handeling best ook thuis nog een paar keer tijdens de eerste 24 uur na het incident, om de pijn te verzachten en ontstekingsverschijnselen te voorkomen.

Ook zal de verpleegkundige een geschikte zalf aanbrengen op de extravasatieplaats en dit afdekken met een verband. U krijgt deze zalf mee naar huis. Het is aangewezen deze zalf 's avonds nogmaals dik aan te brengen (niet volledig inmasseren). U mag dit tot 2x per dag herhalen tot de zwelling is verdwenen.

Vanaf het moment van de extravasatie wordt hoogstand aanbevolen van het lidmaat boven het niveau van het hart om reabsorptie te bevorderen.

Probeer uw arm hoger dan uw schouder te houden als u zit of ligt (dus zo weinig mogelijk uw arm naar beneden laten hangen). Ook kunt u pompende bewegingen met de hand maken om een betere afvoer te krijgen.

## Restletsels

De meeste extravasaties zijn beperkt tot de onderhuidse weke delen en huid. Normaal gezien is er geen restletsel. De pijnlijke reactie duurt normaal gezien minder dan 24-48 uur.

Als u tintelingen, verkramping of doofheid in uw vingers voelt, neemt u best contact op met uw huisarts.

Er bestaat ook een geringe kans dat er ontstekingsverschijnselen (roodheid, pijn, zwelling, warmte) ontstaan rond de plaats waar de contrastvloeistof zich bevindt. Neem ook in dit geval contact op met uw huisarts.



## Contactgegevens

Bij vragen of problemen kan u ons tijdens de openingsuren steeds contacteren:

### Dienst Medische beeldvorming

Tel. 09 310 03 00

## Contrastextravasatie Medische beeldvorming

### Contactinfo

#### **vzw AZ Alma**

(Maatschappelijke Zetel)  
Ringlaan 15  
B-9900 Eeklo  
tel. 09 310 00 00

#### **Polikliniek AZ Alma Sijsele**

Gentse Steenweg 132  
B-8340 Sijsele-Damme  
tel. 09 310 00 00

[www.azalma.be](http://www.azalma.be)

