

Bij bepaalde onderzoeken is het noodzakelijk dat er intraveneus (via een ader) contrast (kleurstof) wordt toegediend. Een allergische reactie op deze kleurstof is zeldzaam maar bestaande. Daarom deze folder om u in te lichten over de mogelijke (normale) bijwerkingen en allergische reacties.

## Allergische reactie ≠ bijwerking

### Mogelijke bijwerkingen

die u kan/mag voelen tijdens de toediening van intraveneus contrast en spontaan verdwijnen tegen het einde van het onderzoek:

- Warmte-opwelling met mogelijks heel warm gevoel ter hoogte van de schaaamstreek en bilnaad (= plasgevoel!).
- Slechte smaak.
- Misselijk worden.

### Allergische reactie

- Lichte reactie:
  - Kriebel in de keel, niezen, jeuk
- Matige reactie:
  - Urticaria (huiduitslag, papelvorming)
  - Ademhalingsmoeilijkheden
- Ernstige reactie:
  - Quincke-oedeem (zwellung ter hoogte van de oogleden, mond- en keelholte)
  - Anafylactische shock

Bij een allergische reactie treden de symptomen vrijwel onmiddellijk op na toediening van het contrast. Uitzonderlijk doen reacties zich laattijdig voor.

## Screening van gekende contrastallergie

Bij gekende allergie voor contrast is het belangrijk dat wij dit op voorhand weten. Daarom wordt dit bij herhaling bevraagd:

- Schriftelijk aan uw aanvragende arts op een in te vullen rubriek op de aanvraag.
- Aan u op een in te vullen veiligheidsvragenlijstje (net vóór het onderzoek).

Wanneer intraveneus contrast noodzakelijk is bij gekende allergie, kan, naargelang de ernst van de symptomen van de vorige allergische reactie, door de radioloog toch overwogen worden om contrast toe te dienen. Eén uur vóór de start van het onderzoek krijgt u dan een infuus toegediend met hierin de noodzakelijke medicatie om de allergische reactie te onderdrukken.

## Rapportage

Wanneer u echt allergisch reageert op het toegediende contrast:

- Wordt uw aanvragende arts hiervan op de hoogte gesteld in het protocol door de uitvoerende radioloog.
- Krijgt u een allergiekaartje mee, door u te bewaren en telkens voor te leggen wanneer men u intraveneus contrast wil toedienen.
- Registreren wij deze allergische reactie ook in onze database zodat wij hiervan automatisch worden verwittigd bij uw volgende inschrijving op onze dienst Medische beeldvorming.

## Laattijdige reacties op intraveneus contrast

Deze komen heel zelden voor, maar de kans is bestaande.

Merkt u één of meerdere symptomen van allergische reactie bij of na uw thuiskomst, neem dan **onmiddellijk** contact op met uw behandelende arts.



## Contactgegevens

### Dienst Medische beeldvorming

Tel. 09 310 03 00

Contraststof:  
bijwerkingen en  
allergische reacties  
Medische beeldvorming

## Contactinfo

### **vzw AZ Alma**

(Maatschappelijke Zetel)  
Ringlaan 15  
B-9900 Eeklo  
tel. 09 310 00 00

### **Polikliniek AZ Alma Sijsele**

Gentse Steenweg 132  
B-8340 Sijsele-Damme  
tel. 09 310 00 00

[www.azalma.be](http://www.azalma.be)

