

Wat is een RX slikfunctie - slokdarm?

Dit onderzoek wordt voornamelijk aangevraagd indien u zich vaak verslikt of een gevoel hebt dat het eten blijft 'hangen' in de keel (globusgevoel).

Tijdens dit onderzoek worden er röntgenbeelden gemaakt van de keel tijdens het drinken van een kleurstof (barium). Zo kunnen alle fases van de slikbeweging geanalyseerd worden.

Afhankelijk van de indicatie kan dit onderzoek aangevuld worden met een onderzoek van de slokdarm of slokdarm-maag-duodenum (zelfde verloop).

De contrastvloeistof die gebruikt wordt hiervoor bevat Barium of Iodium.

Praktische richtlijnen voor uw onderzoek

U dient in het bezit te zijn van een medisch voorschrift/verwijsbrief van een arts. Breng dit voorschrift zeker mee zodat wij het gewenste onderzoek correct kunnen uitvoeren.

Voor een RX slikfunctie dient u steeds vooraf een afspraak te maken.

U meldt zich tijdig aan met uw identiteitskaart aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis, waar u individuele patiëntenetiketten zult ontvangen.

Vervolgens meldt u zich aan bij het secretariaat van Medische Beeldvorming (DOW1 = blok D, gelijkvloers verdieping 0, wachtzaal 1), waar men u na inschrijving zal verwijzen naar de juiste wachtzaal.

Vorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn.

Kledij en metalen voorwerpen in de te onderzoeken regio dient u te verwijderen (juwelen, piercings,...). U kan eventueel gebruik maken van een ziekenhuishemd.

Een vals gebit dient tijdelijk verwijderd te worden.

Vermeld een mogelijke zwangerschap of gekende allergieën steeds vóór het onderzoek.

Verloop van het onderzoek

De verpleegkundige/technoloog zal u binnen roepen in de RX-ruimte en geeft u de nodige instructies

met een kort woordje uitleg over de inhoud en het verloop van het onderzoek.

De radioloog coördineert het verloop van het onderzoek, bijgestaan door een verpleegkundige-technoloog.

In zittende of staande houding worden er eerst 2 beelden gemaakt van de keelregio.

Nadien wordt u in zittende/staande houding een paar keer gevraagd om enkele slokken contrastvloeistof door te slikken. Terwijl u slikt zullen er 'bewegende' röntgenbeelden gemaakt worden.

Het volledige onderzoek duurt gemiddeld 10 minuten.

Nazorg

Na uw onderzoek(en) mag u onmiddellijk doorgaan.

In sommige gevallen dient u even te wachten, bijvoorbeeld bij eventuele doorverwijzing naar Spoedgevallen of bijkomende onderzoeken. De uitvoerende RX-verpleegkundige-technoloog zal u hiertoe verzoeken indien nodig.

Het is aanbevolen om de eerstvolgende 24 uur veel water te drinken om een vlotte afvoer van het contrastmiddel uit het lichaam te bevorderen.

Indien Barium-bevattend contrast werd gebruikt (witte papachtige vloeistof) kan uw stoelgang enkele dagen afwijken van kleur (wit). Dit is normaal. Barium kan ook constiperend werken.

Indien Iodium-bevattend contrast werd gebruikt (waterachtige kleurloze vloeistof) dient u rekening te houden met een laxerende (stoelgangbevorderende) bijwerking.

Uw resultaten

Na het onderzoek worden de resultaten automatisch doorgestuurd naar de aanvragende arts.

Aan het loket van de medische beeldvorming heeft u een kaartje met uw persoonlijke code ontvangen. Via de link hierop vermeld, kan u uw beelden raadplegen op een computer.

Contactgegevens

Dienst Medische beeldvorming

Tel. 09 310 03 00

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be

RX slikfunctie- slokdarm Medische beeldvorming

