

Doel van het onderzoek

Opsporen en bepalen van de lokalisatie van overactief bijschildklierweefsel.

Vorbereiding op het onderzoek

Geen.
U mag voor dit onderzoek eten en drinken.

Indien u schildkliermedicatie neemt, wordt deze best 5 dagen vooraf gestopt (in overleg met uw arts). Strumazol moet worden gestopt 1 week vóór het onderzoek, daarna terug verder nemen.

Is dit onderzoek gevaarlijk?

Neen.
Dit onderzoek is niet gevaarlijk en ook niet pijnlijk.

De eerste uren na het onderzoek best 1 meter afstand houden van zwangere vrouwen.

Bijwerkingen

Geen.

Duur van het onderzoek

U voorziet best een halve dag.

Uitvoering van het onderzoek

's Morgens: eerste inspuiting.
2 à 3 uur later: tweede inspuiting, gevolgd door scan (duur: 45 minuten).

Resultaat van het onderzoek

Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt voor de behandelende arts die u ook het resultaat zal meedelen en indien nodig de gepaste therapie zal starten.

Praktische info

Inschrijven

Dienst Inschrijvingen (naast het Onthaal)

- Identiteitskaart

Secretariaat Nucleaire geneeskunde (D0.W3)

- Etiketten inschrijving
- Verwijsbrief arts
- NIET nuchter

Uw afspraak

Het is noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken voor dit onderzoek.

We vragen u om op tijd aanwezig te zijn.

Als u toch **verhinderd** bent en uw afspraak niet kan nakomen, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op: tel. 09 310 06 85.

Indien u zwanger bent of u borstvoeding geeft, meld dit onmiddellijk aan het personeel van de dienst Nucleaire geneeskunde.



Contactgegevens

Nucleaire geneeskunde

Tel. 09 310 06 85

Dr. P. Gykiere

Dr. E. Obrie

Bijschildklierscan
Nucleaire geneeskunde

Contactinfo

vzw AZ Alma

(Maatschappelijke Zetel)

Ringlaan 15

B-9900 Eeklo

tel. 09 310 00 00

Polikliniek AZ Alma Sijsele

Gentse Steenweg 132

B-8340 Sijsele-Damme

tel. 09 310 00 00

www.azalma.be

