

## Doel van het onderzoek

Opsporen en bepalen van de lokalisatie van overactief bijschildklierweefsel.

## Vorbereiding op het onderzoek

Geen.  
U mag voor dit onderzoek eten en drinken.

Indien u schildkliermedicatie neemt, wordt deze best 5 dagen vooraf gestopt (in overleg met uw arts). Strumazol moet worden gestopt 1 week vóór het onderzoek, daarna terug verder nemen.

## Is dit onderzoek gevaarlijk?

Neen.  
Dit onderzoek is niet gevaarlijk en ook niet pijnlijk.

De eerste uren na het onderzoek best 1 meter afstand houden van zwangere vrouwen.

## Bijwerkingen

Geen.

## Duur van het onderzoek

U voorziet best een halve dag.

## Uitvoering van het onderzoek

's Morgens: eerste inspuiting.  
2 à 3 uur later: tweede inspuiting, gevolgd door scan (duur: 45 minuten).

## Resultaat van het onderzoek

Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt voor de behandelende arts die u ook het resultaat zal meedelen en indien nodig de gepaste therapie zal starten.

## Praktische info

### Inschrijven

**Dienst Inschrijvingen** (naast het Onthaal)

- Identiteitskaart

**Secretariaat Nucleaire geneeskunde** (D0.W3)

- Etiketten inschrijving
- Verwijsbrief arts
- NIET nuchter

## Uw afspraak

Het is noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken voor dit onderzoek.

We vragen u om op tijd aanwezig te zijn.

Als u toch **verhinderd** bent en uw afspraak niet kan nakomen, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op: tel. 09 310 06 85.

**Indien u zwanger bent of u borstvoeding geeft, meld dit onmiddellijk aan het personeel van de dienst Nucleaire geneeskunde.**



## Contactgegevens

### Nucleaire geneeskunde

Tel. 09 310 06 85

Dr. P. Gykiere

Dr. E. Obrie

**Bijschildklierscan**  
**Nucleaire geneeskunde**

## Contactinfo

### **vzw AZ Alma**

(Maatschappelijke Zetel)

Ringlaan 15

B-9900 Eeklo

tel. 09 310 00 00

### **Polikliniek AZ Alma Sijsele**

Gentse Steenweg 132

B-8340 Sijsele-Damme

tel. 09 310 00 00

[www.azalma.be](http://www.azalma.be)

