Doel van het onderzoek

Opsporen en bepalen van de lokalisatie van overactief bijschildklierweefsel.

Voorbereiding op het onderzoek

Geen.
U mag voor dit onderzoek eten en drinken.

Indien u schildkliermedicatie neemt, wordt deze best 5 dagen vooraf gestopt (in overleg met uw arts). Strumazol moet worden gestopt 1 week vóór het onderzoek, daarna terug verder nemen.

Is dit onderzoek gevaarlijk?

Neen.
Dit onderzoek is niet gevaarlijk en ook niet pijnlijk.

De eerste uren na het onderzoek best 1 meter afstand houden van zwangere vrouwen.

Bijwerkingen

Geen.

Duur van het onderzoek

U voorziet best een halve dag.

Uitvoering van het onderzoek

's Morgens: eerste inspuiting.
2 à 3 uur later: tweede inspuiting, gevolgd door scan (duur: 45 minuten).

Resultaat van het onderzoek

Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt voor de behandelende arts die u ook het resultaat zal meedelen en indien nodig de gepaste therapie zal starten.

Praktische info

Inschrijven

Dienst Inschrijvingen (naast het Onthaal)
- Identiteitskaart

Secretariaat Nucleaire geneeskunde (D0.W3)
- Etiketten inschrijving
- Verwijsbrief arts
- NIET nuchter

Uw afspraak

Het is noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken voor dit onderzoek.

We vragen u om op tijd aanwezig te zijn.

Als u toch **verhinderd** bent en uw afspraak niet kan nakomen, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op: tel. 09 310 06 85.

Indien u zwanger bent of u borstvoeding geeft, meld dit onmiddellijk aan het personeel van de dienst Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Nucleaire geneeskunde
Tel. 09 310 06 85
Dr. P. Gykiere
Dr. E. Obrie

v23-04-2021
V.U.: vzw AZ ALMA - Ringlaan 15 - 9900 Eeklo
Ond.nr. 0463.862.908

SAP 27609

0501-AD-Extern

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be

Bijschildklierscan

Nucleaire geneeskunde